

Diez primeras causas de morbilidad de los pacientes intervenidos en cirugía, por grupos de edad y sexo de acuerdo a capítulos de la CIE-10. 2021

Ord.	Causas de morbilidad según CIE-10	Frecuencia	Porcentaje	Grupo de edad						Sexo		Destino a la salida de la cirugía	
				-1	1-4	5-14	15-44	45-59	60 +	F	M	Hospitalización	Alta
1	APENDICITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	246	2.0%	139	6	38	53	7	3	96	150	119	127
2	FRACTURA DE LA EPIFISIS INFERIOR DEL RADIO	171	1.4%	107	0	3	37	14	10	66	105	19	152
3	FRACTURA DE LA DIAFISIS DE LA TIBIA	161	1.3%	79	1	3	56	14	8	31	130	137	24
4	FRACTURA DE LA EPIFISIS SUPERIOR DE LA TIBIA	137	1.1%	71	0	0	46	14	6	33	104	111	26
5	INFECCION CONSECUTIVA A PROCEDIMIENTO, NO CLASIFICADA EN OTRA PARTE	128	1.0%	81	0	7	17	9	14	43	85	126	2
6	PREPUCIO REDUNDANTE, FIMOSIS Y PARAFIMOSIS	121	1.0%	76	13	8	14	8	2	0	121	0	121
7	APENDICITIS, NO ESPECIFICADA	118	1.0%	65	0	16	29	5	3	48	70	53	65
8	OSTEOMIELITIS, NO ESPECIFICADA	114	0.9%	65	0	2	18	19	10	36	78	109	5
9	FRACTURA DE LA EPIFISIS INFERIOR DE LA TIBIA	114	0.9%	53	0	3	30	18	10	26	88	68	46
10	FRACTURA DEL FEMUR, PARTE NO ESPECIFICADA	103	0.8%	62	0	7	19	1	14	45	58	96	7
Subtotal		1,413	11.5%	798	20	87	319	109	80	424	989	838	575
Total General		12,269	100.0%	6,978	195	388	2,242	1,040	1,426	4,755	7,514	3,774	8,495

Fuente de Información: Departamento de Informática en salud